


ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

10 DE ENERO
2019



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

ISSN 2591-4200



- I - NOA (Noroeste Argentino)
- II - NEA (Noreste Argentino)
- III - Centro-Norte de Córdoba
- IV - Sur de Córdoba
- V - Centro-Norte de Santa Fe
- VI - Núcleo Norte
- VII - Núcleo Sur
- VIII - Centro-Este de Entre Ríos
- IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
- X - Centro de Buenos Aires
- XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
- XII - Sudeste de Buenos Aires
- XIII - San Luis
- XIV - Cuenca del Salado
- XV - Corrientes - Misiones

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J Copati
ecopati@bc.org.ar

COORDINADOR

Ing. Gonzalo Hermida
ghermida@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVO

Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar
Trigo y Girasol

Santiago Burrone
sburrone@bc.org.ar
Maíz

Ing. Ayelén Gago
amgago@bc.org.ar
Soja

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2591-4200

NUEVAS PRECIPITACIONES AUMENTAN LOS EXCESOS HÍDRICOS Y DEMORAN LA IMPLANTACIÓN DE SOJA Y MAÍZ

Las continuas precipitaciones acumuladas a lo largo de la campaña favorecen el desarrollo del ciclo fenológico en vastos sectores implantados con maíz destino grano comercial, de todas maneras, las mismas también dificultaron la implantación y emergencia en lotes tardíos y de segunda ocupación. La condición de cultivo continúa mejorando y a la fecha el 58,7% de los sembrados en fechas tempranas varían entre buena y excelente, aunque se relevaron cuadros puntuales afectados por caídas de granizo sobre La Pampa y el sur de Buenos Aires. El 11% de los maíces tempranos de la región Centro-Norte de Santa Fe se encuentran desarrollando la etapa de madurez fisiológica, mientras que al mismo tiempo se registraron las primeras cosechas en la provincia de Misiones.

El 48,8% del área total sembrada de soja presenta una condición de buena a excelente. Si bien los excesos hídricos han incrementado en 7,2 puntos porcentuales en relación a la semana pasada, esta condición afecta principalmente las labores de siembra en lotes de segunda. Las regiones Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos han sido las más afectadas por las últimas precipitaciones, incrementando la participación de lotes con condición de regular a mala y excesos hídricos que afectan a más del 20% de la superficie. Con lotes diferenciando flores en gran parte del área agrícola, en la provincia de Córdoba y en los Núcleos Norte y Sur los primeros lotes ya se encuentran diferenciando vainas en muy buenas condiciones.

Por otra parte, el avance de cosecha de girasol alcanzó el 18,8% del área implantada en la presente campaña. Sin embargo, las precipitaciones registradas en el transcurso de la última semana detuvieron de manera parcial el progreso de recolección sobre las regiones del norte del país. Actualmente el 10,5% del área implantada con girasol se encuentra en condiciones de exceso hídrico, un escenario prácticamente opuesto al de la campaña pasada, ya que, a igual semana, el 12,6% del área se encontraba en condición de sequía. Por otro lado, la condición de cultivo continúa relativamente estable con un 90,1% en estado normal a excelente.

METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 9 de Enero de 2019. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Soja 1º

Siembra de Soja 1ª: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I NOA | 65,0 | 87,0 | 91,0 | 68,0 |
| II NEA | 50,0 | 50,0 | 77,0 | 67,2 |
| III Ctro N Cba | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| IV S Cba | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| V Ctro N SFe | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,6 |
| VI Núcleo Norte | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| VII Núcleo Sur | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| VIII Ctro E ER | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| IX N LP-OBA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| X Ctro Bs As | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| XI SO BA-S LP | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| XII SE BA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| XIII San Luis | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| XIV Cuenca Sal | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| XV Otras | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Total Soja 1ª | 94,7 | 96,0 | 98,0 | 95,8 |

Condición de Soja 1ª: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | Mala % | Regular % | Normal % | Buena % | Excelente % |
|--------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| I NOA | - | - | 38,0 | 46,0 | 16,0 |
| II NEA | - | 10,0 | 57,0 | 33,0 | - |
| III Ctro N Cba | - | 1,0 | 33,0 | 59,0 | 7,0 |
| IV S Cba | - | 12,0 | 50,0 | 33,0 | 5,0 |
| V Ctro N SFe | 1,0 | 6,0 | 51,0 | 42,0 | - |
| VI Núcleo Norte | - | 6,0 | 31,0 | 44,0 | 19,0 |
| VII Núcleo Sur | - | 3,0 | 32,0 | 53,0 | 12,0 |
| VIII Ctro E ER | 4,0 | 22,0 | 45,0 | 29,0 | - |
| IX N LP-OBA | 3,0 | 12,0 | 39,0 | 41,0 | 5,0 |
| X Ctro Bs As | - | - | - | - | - |
| XI SO BA-S LP | - | - | - | - | - |
| XII SE BA | - | 6,0 | 42,0 | 46,0 | 6,0 |
| XIII San Luis | - | - | - | - | - |
| XIV Cuenca Sal | - | - | - | - | - |
| XV Otras | - | - | - | - | - |
| Total Soja 1ª | 0,8 | 7,5 | 40,0 | 43,9 | 7,8 |
| Total al 10-01-18 | 0,5 | 20,6 | 35,6 | 40,9 | 2,3 |

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Soja 1ª: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Sequía % | Regular % | Adecuada % | Óptima % | Exceso % |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| I | NOA | - | 5,0 | 47,0 | 41,0 | 7,0 |
| II | NEA | - | - | 29,0 | 48,0 | 23,0 |
| III | Ctro N Cba | - | 1,0 | 66,0 | 28,0 | 5,0 |
| IV | S Cba | - | 16,0 | 69,0 | 15,0 | - |
| V | Ctro N SFe | - | - | 48,0 | 33,0 | 19,0 |
| VI | Núcleo Norte | - | - | 28,0 | 54,0 | 18,0 |
| VII | Núcleo Sur | - | - | 33,0 | 51,0 | 16,0 |
| VIII | Ctro E ER | - | - | 38,0 | 28,0 | 34,0 |
| IX | N LP-OBA | - | - | 47,0 | 40,0 | 13,0 |
| X | Ctro Bs As | - | - | - | - | - |
| XI | SO BA-S LP | - | - | - | - | - |
| XII | SE BA | - | 14,0 | 59,0 | 27,0 | - |
| XIII | San Luis | - | - | - | - | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - | - |
| Total Soja 1ª | | - | 2,7 | 45,7 | 37,8 | 13,8 |
| Total al 10-01-18 | | 3,8 | 36,7 | 58,0 | 1,4 | - |

Diferenciación de Hojas de Soja 1ª: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | 22,0 | 39,0 | 50,0 | 23,8 |
| II | NEA | 29,0 | 34,0 | 45,0 | 30,0 |
| III | Ctro N Cba | 95,0 | 73,0 | 85,0 | 88,0 |
| IV | S Cba | 100,0 | 85,0 | 95,0 | 98,5 |
| V | Ctro N SFe | 90,0 | 73,0 | 85,0 | 87,4 |
| VI | Núcleo Norte | 100,0 | 95,0 | 100,0 | 95,4 |
| VII | Núcleo Sur | 100,0 | 96,0 | 100,0 | 99,0 |
| VIII | Ctro E ER | 100,0 | 86,0 | 96,0 | 98,4 |
| IX | N LP-OBA | 97,0 | 90,0 | 99,0 | 99,4 |
| X | Ctro Bs As | - | - | - | - |
| XI | SO BA-S LP | - | - | - | - |
| XII | SE BA | 97,0 | 71,0 | 82,0 | 88,2 |
| XIII | San Luis | - | - | - | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - |
| Total Soja 1ª | | 89,2 | 80,1 | 88,9 | 86,2 |

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Floración (R1) de Soja 1ª: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | - | - | 2,0 | - |
| II | NEA | - | - | - | - |
| III | Ctro N Cba | 63,0 | 35,0 | 46,0 | 57,0 |
| IV | S Cba | 62,0 | 39,0 | 50,0 | 52,2 |
| V | Ctro N SFe | 59,0 | 25,0 | 38,0 | 51,6 |
| VI | Núcleo Norte | 80,0 | 51,0 | 63,0 | 67,0 |
| VII | Núcleo Sur | 70,0 | 43,0 | 55,0 | 62,0 |
| VIII | Ctro E ER | 60,0 | 27,0 | 38,0 | 50,6 |
| IX | N LP-OBA | 50,0 | 38,0 | 50,0 | 58,0 |
| X | Ctro Bs As | - | - | - | - |
| XI | SO BA-S LP | - | - | - | - |
| XII | SE BA | 20,0 | 6,0 | 16,0 | 13,7 |
| XIII | San Luis | - | - | - | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - |
| Total Soja 1ª | | 53,7 | 31,7 | 42,1 | 47,5 |

Comienzo de Fructificación (R3) de Soja 1ª: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | - | - | - | - |
| II | NEA | - | - | - | - |
| III | Ctro N Cba | 20,0 | 5,0 | 15,0 | 18,8 |
| IV | S Cba | 20,0 | - | 11,0 | 16,2 |
| V | Ctro N SFe | 10,0 | - | - | 15,6 |
| VI | Núcleo Norte | 20,0 | 8,0 | 19,0 | 15,4 |
| VII | Núcleo Sur | 10,0 | - | 9,0 | 11,0 |
| VIII | Ctro E ER | 1,0 | - | - | 3,4 |
| IX | N LP-OBA | 5,0 | - | 6,0 | 9,4 |
| X | Ctro Bs As | - | - | - | - |
| XI | SO BA-S LP | - | - | - | - |
| XII | SE BA | - | - | - | - |
| XIII | San Luis | - | - | - | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - |
| Total Soja 1ª | | 10,3 | 1,8 | 7,9 | 10,2 |

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Soja 2º

Siembra de Soja 2ª: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | 65,0 | 45,0 | 75,0 | 68,0 |
| II | NEA | 50,0 | 35,0 | 68,0 | 67,2 |
| III | Ctro N Cba | 100,0 | 97,0 | 98,0 | 100,0 |
| IV | S Cba | 100,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 |
| V | Ctro N SFe | 100,0 | 94,0 | 94,5 | 98,6 |
| VI | Núcleo Norte | 100,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 |
| VII | Núcleo Sur | 100,0 | 85,0 | 96,0 | 100,0 |
| VIII | Ctro E ER | 100,0 | 70,0 | 90,0 | 100,0 |
| IX | N LP-OBA | 100,0 | 80,0 | 94,0 | 100,0 |
| X | Ctro Bs As | 100,0 | 61,0 | 92,0 | 100,0 |
| XI | SO BA-S LP | 100,0 | 80,0 | 95,0 | 100,0 |
| XII | SE BA | 100,0 | 36,0 | 90,0 | 100,0 |
| XIII | San Luis | 100,0 | 75,0 | 87,0 | 100,0 |
| XIV | Cuenca Sal | 100,0 | 45,0 | 68,0 | 100,0 |
| XV | Otras | 100,0 | 65,0 | 88,0 | 100,0 |
| Total Soja 2ª | | 94,7 | 75,5 | 91,9 | 95,8 |

Condición de Soja 2ª: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Mala % | Regular % | Normal % | Buena % | Excelente % |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| I | NOA | - | - | 38,0 | 46,0 | 16,0 |
| II | NEA | - | 10,0 | 57,0 | 33,0 | - |
| III | Ctro N Cba | - | 3,0 | 52,0 | 45,0 | - |
| IV | S Cba | - | 6,0 | 52,0 | 35,0 | 7,0 |
| V | Ctro N SFe | 1,0 | 13,0 | 52,0 | 34,0 | - |
| VI | Núcleo Norte | - | 9,0 | 43,0 | 44,0 | 4,0 |
| VII | Núcleo Sur | 2,0 | 12,0 | 53,0 | 33,0 | - |
| VIII | Ctro E ER | 7,0 | 56,0 | 37,0 | - | - |
| IX | N LP-OBA | 2,0 | 13,0 | 45,0 | 37,0 | 3,0 |
| X | Ctro Bs As | - | - | 50,0 | 50,0 | - |
| XI | SO BA-S LP | - | 3,0 | 40,0 | 43,0 | 14,0 |
| XII | SE BA | - | 2,0 | 60,0 | 34,0 | 4,0 |
| XIII | San Luis | - | - | - | - | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - | - |
| Total Soja 2ª | | 0,8 | 9,6 | 49,2 | 37,1 | 3,4 |
| Total al 10-01-18 | | 0,7 | 29,2 | 37,9 | 32,1 | - |

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Soja 2ª: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Sequía % | Regular % | Adecuada % | Óptima % | Exceso % |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| I | NOA | - | 6,0 | 46,0 | 41,0 | 7,0 |
| II | NEA | - | - | 29,0 | 48,0 | 23,0 |
| III | Ctro N Cba | - | 6,0 | 62,0 | 26,0 | 6,0 |
| IV | S Cba | - | 23,0 | 62,0 | 15,0 | - |
| V | Ctro N SFe | - | - | 42,0 | 35,0 | 23,0 |
| VI | Núcleo Norte | - | - | 31,0 | 53,0 | 16,0 |
| VII | Núcleo Sur | - | - | 34,0 | 45,0 | 21,0 |
| VIII | Ctro E ER | - | - | 44,0 | 17,0 | 39,0 |
| IX | N LP-OBA | - | - | 46,0 | 37,0 | 17,0 |
| X | Ctro Bs As | - | - | - | - | - |
| XI | SO BA-S LP | - | - | - | - | - |
| XII | SE BA | - | 13,0 | 66,0 | 21,0 | - |
| XIII | San Luis | - | - | - | - | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - | - |
| Total Soja 2ª | | - | 4,2 | 46,6 | 35,4 | 13,8 |
| Total al 10-01-18 | | 6,0 | 38,1 | 55,0 | 1,0 | - |

Diferenciación de Hojas de Soja 2ª: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | 15,0 | 18,0 | 30,0 | 20,0 |
| II | NEA | 10,0 | 10,0 | 23,0 | 25,0 |
| III | Ctro N Cba | 75,0 | 69,0 | 73,0 | 73,6 |
| IV | S Cba | 66,0 | 65,0 | 64,0 | 65,0 |
| V | Ctro N SFe | 68,0 | 60,0 | 66,0 | 66,4 |
| VI | Núcleo Norte | 84,0 | 59,0 | 81,0 | 78,0 |
| VII | Núcleo Sur | 67,0 | 46,0 | 65,0 | 68,2 |
| VIII | Ctro E ER | 66,0 | 45,0 | 64,0 | 75,0 |
| IX | N LP-OBA | 70,0 | 64,0 | 71,0 | 65,3 |
| X | Ctro Bs As | 50,0 | 29,0 | 48,0 | 58,3 |
| XI | SO BA-S LP | 35,0 | 22,0 | 73,0 | 33,3 |
| XII | SE BA | 32,0 | 30,0 | 42,0 | 29,2 |
| XIII | San Luis | 39,0 | 26,0 | 39,0 | 40,0 |
| XIV | Cuenca Sal | 39,0 | 26,0 | 39,0 | 41,7 |
| XV | Otras | 52,0 | 40,0 | 52,0 | 50,0 |
| Total Soja 6ª | | 55,8 | 45,9 | 60,7 | 54,9 |

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Floración (R1) de Soja 2ª: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | - | - | - | - |
| II | NEA | - | - | - | - |
| III | Ctro N Cba | - | - | - | - |
| IV | S Cba | - | - | 5,0 | - |
| V | Ctro N SFe | - | - | - | - |
| VI | Núcleo Norte | 7,0 | - | - | 8,0 |
| VII | Núcleo Sur | 5,0 | - | - | 5,0 |
| VIII | Ctro E ER | - | - | - | - |
| IX | N LP-OBA | - | - | - | - |
| X | Ctro Bs As | - | - | - | - |
| XI | SO BA-S LP | - | - | - | - |
| XII | SE BA | - | - | - | - |
| XIII | San Luis | - | - | - | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - |
| Total Soja 6ª | | 1,4 | - | 0,4 | 1,4 |

Soja Total

Siembra de Soja Total: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | 65,0 | 72,8 | 85,6 | 66,7 |
| II | NEA | 51,6 | 45,3 | 74,2 | 65,3 |
| III | Ctro N Cba | 100,0 | 99,2 | 99,5 | 99,6 |
| IV | S Cba | 100,0 | 99,5 | 100,0 | 99,8 |
| V | Ctro N SFe | 97,3 | 97,9 | 98,1 | 97,2 |
| VI | Núcleo Norte | 100,0 | 99,4 | 99,7 | 99,8 |
| VII | Núcleo Sur | 100,0 | 96,3 | 99,0 | 99,9 |
| VIII | Ctro E ER | 100,0 | 93,7 | 97,9 | 99,7 |
| IX | N LP-OBA | 100,0 | 95,1 | 98,5 | 99,4 |
| X | Ctro Bs As | 100,0 | 81,4 | 96,2 | 98,1 |
| XI | SO BA-S LP | 100,0 | 86,2 | 96,6 | 90,0 |
| XII | SE BA | 100,0 | 64,7 | 94,5 | 92,6 |
| XIII | San Luis | 100,0 | 98,6 | 99,3 | 100,0 |
| XIV | Cuenca Sal | 100,0 | 64,3 | 79,2 | 99,0 |
| XV | Otras | 100,0 | 82,8 | 94,1 | 99,6 |
| Total Soja | | 94,3 | 89,7 | 96,1 | 94,3 |

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición de Soja Total: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Mala % | Regular % | Normal % | Buena % | Excelente % |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| I | NOA | - | - | 38,0 | 46,0 | 16,0 |
| II | NEA | - | 10,0 | 57,0 | 33,0 | - |
| III | Ctro N Cba | - | 1,5 | 37,9 | 55,4 | 5,2 |
| IV | S Cba | - | 10,6 | 50,5 | 33,5 | 5,5 |
| V | Ctro N SFe | 1,0 | 8,4 | 51,3 | 39,3 | - |
| VI | Núcleo Norte | - | 6,9 | 34,7 | 44,0 | 14,3 |
| VII | Núcleo Sur | 0,5 | 5,1 | 37,0 | 48,3 | 9,2 |
| VIII | Ctro E ER | 4,6 | 28,6 | 43,5 | 23,4 | - |
| IX | N LP-OBA | 2,8 | 12,2 | 40,4 | 40,1 | 4,5 |
| X | Ctro Bs As | - | - | - | - | - |
| XI | SO BA-S LP | - | - | - | - | - |
| XII | SE BA | - | 6,0 | 42,0 | 46,0 | 6,0 |
| XIII | San Luis | - | - | - | - | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - | - |
| Total Soja | | 0,8 | 8,3 | 42,1 | 42,2 | 6,6 |
| Total al 10-01-18 | | 0,6 | 23,1 | 36,2 | 38,5 | 1,7 |

Condición Hídrica de Soja Total: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Sequía % | Regular % | Adecuada % | Óptima % | Exceso % |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| I | NOA | - | 5,3 | 46,7 | 41,0 | 7,0 |
| II | NEA | - | - | 29,0 | 48,0 | 23,0 |
| III | Ctro N Cba | - | 2,3 | 65,0 | 27,5 | 5,3 |
| IV | S Cba | - | 17,7 | 67,3 | 15,0 | - |
| V | Ctro N SFe | - | - | 46,0 | 33,7 | 20,3 |
| VI | Núcleo Norte | - | - | 28,9 | 53,7 | 17,4 |
| VII | Núcleo Sur | - | - | 33,2 | 49,6 | 17,2 |
| VIII | Ctro E ER | - | - | 39,2 | 25,9 | 35,0 |
| IX | N LP-OBA | - | - | 46,8 | 39,3 | 13,9 |
| X | Ctro Bs As | - | - | - | - | - |
| XI | SO BA-S LP | - | - | - | - | - |
| XII | SE BA | - | 14,0 | 59,0 | 27,0 | - |
| XIII | San Luis | - | - | - | - | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - | - |
| Total Soja | | - | 3,2 | 45,7 | 37,4 | 13,8 |
| Total al 10-01-18 | | 4,5 | 37,1 | 57,1 | 1,3 | - |

Diferenciación de Hojas de Soja Total: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | 19,5 | 31,9 | 43,3 | 22,5 |
| II | NEA | 22,8 | 26,5 | 38,1 | 28,4 |
| III | Ctro N Cba | 89,1 | 71,9 | 81,8 | 84,2 |
| IV | S Cba | 92,8 | 80,2 | 87,6 | 90,5 |
| V | Ctro N SFe | 83,3 | 68,4 | 78,3 | 80,0 |
| VI | Núcleo Norte | 95,7 | 83,7 | 94,0 | 89,9 |
| VII | Núcleo Sur | 93,5 | 83,8 | 91,4 | 91,5 |
| VIII | Ctro E ER | 94,1 | 77,4 | 89,3 | 93,5 |
| IX | N LP-OBA | 91,0 | 83,7 | 92,2 | 91,1 |
| X | Ctro Bs As | - | - | - | - |
| XI | SO BA-S LP | - | - | - | - |
| XII | SE BA | 66,8 | 49,3 | 60,8 | 56,9 |
| XIII | San Luis | - | - | - | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - |
| Total Soja | | 79,6 | 69,5 | 80,2 | 77,0 |

Comienzo de Floración (R1) de Soja Total: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | - | - | 1,3 | - |
| II | NEA | - | - | - | - |
| III | Ctro N Cba | 44,4 | 25,8 | 33,9 | 42,0 |
| IV | S Cba | 48,8 | 29,6 | 39,2 | 39,7 |
| V | Ctro N SFe | 41,1 | 16,2 | 24,7 | 33,5 |
| VI | Núcleo Norte | 60,2 | 35,0 | 43,2 | 48,5 |
| VII | Núcleo Sur | 57,3 | 32,5 | 41,5 | 48,1 |
| VIII | Ctro E ER | 49,6 | 21,3 | 30,0 | 40,0 |
| IX | N LP-OBA | 38,9 | 28,7 | 37,8 | 43,9 |
| X | Ctro Bs As | - | - | - | - |
| XI | SO BA-S LP | - | - | - | - |
| XII | SE BA | 10,7 | 2,8 | 7,5 | 6,4 |
| XIII | San Luis | - | - | - | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - |
| Total Soja | | 38,7 | 21,9 | 29,1 | 33,3 |

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Fructificación (R3) de Soja Total: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | - | - | - | - |
| II | NEA | - | - | - | - |
| III | Ctro N Cba | 14,1 | 3,7 | 11,0 | 13,8 |
| IV | S Cba | 15,7 | - | 8,4 | 12,3 |
| V | Ctro N SFe | 7,0 | - | - | 10,1 |
| VI | Núcleo Norte | 14,6 | 5,5 | 13,0 | 10,6 |
| VII | Núcleo Sur | 8,0 | - | 6,8 | 8,3 |
| VIII | Ctro E ER | 0,8 | - | - | 2,7 |
| IX | N LP-OBA | 3,9 | - | 4,5 | 7,1 |
| X | Ctro Bs As | - | - | - | - |
| XI | SO BA-S LP | - | - | - | - |
| XII | SE BA | - | - | - | - |
| XIII | San Luis | - | - | - | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - |
| Total Soja | | 7,3 | 1,2 | 5,4 | 7,0 |

Maíz Temprano

Siembra de Maíz Temprano: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|----------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | 30,0 | 42,0 | 55,0 | 35,4 |
| II | NEA | 36,0 | 33,0 | 38,0 | 42,3 |
| III | Ctro N Cba | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| IV | S Cba | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| V | Ctro N SFe | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| VI | Núcleo Norte | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| VII | Núcleo Sur | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| VIII | Ctro E ER | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| IX | N LP-OBA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| X | Ctro Bs As | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| XI | SO BA-S LP | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| XII | SE BA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| XIII | San Luis | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| XIV | Cuenca Sal | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| XV | Otras | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Total Maíz Temprano | | 77,9 | 79,1 | 81,7 | 80,9 |

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición de Maíz Temprano: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Mala % | Regular % | Normal % | Buena % | Excelente % |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I | NOA | - | 3,0 | 45,0 | 44,0 | 8,0 |
| II | NEA | - | - | - | - | - |
| III | Ctro N Cba | - | 6,0 | 39,0 | 45,0 | 10,0 |
| IV | S Cba | 1,0 | 17,0 | 44,0 | 35,0 | 3,0 |
| V | Ctro N SFe | - | 7,0 | 29,0 | 48,0 | 16,0 |
| VI | Núcleo Norte | - | 2,0 | 26,0 | 55,0 | 17,0 |
| VII | Núcleo Sur | - | - | 22,0 | 59,0 | 19,0 |
| VIII | Ctro E ER | - | - | - | - | - |
| IX | N LP-OBA | 1,0 | 4,0 | 39,0 | 48,0 | 8,0 |
| X | Ctro Bs As | 1,0 | 8,0 | 45,0 | 38,0 | 8,0 |
| XI | SO BA-S LP | - | - | - | - | - |
| XII | SE BA | - | 4,0 | 47,0 | 45,0 | 4,0 |
| XIII | San Luis | 2,0 | 25,0 | 47,0 | 26,0 | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - | - |
| Total Maíz Temprano | | 0,3 | 4,9 | 36,1 | 47,7 | 11,0 |
| Total al 10-01-18 | | 12,2 | 19,7 | 25,9 | 40,0 | 2,3 |

Condición Hídrica de Maíz Temprano: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Sequía % | Regular % | Adecuada % | Óptima % | Exceso % |
|----------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| I | NOA | - | - | 41,0 | 53,0 | 6,0 |
| II | NEA | - | - | - | - | - |
| III | Ctro N Cba | - | 8,0 | 64,0 | 27,0 | 1,0 |
| IV | S Cba | - | 28,0 | 58,0 | 14,0 | - |
| V | Ctro N SFe | - | - | 31,0 | 57,0 | 12,0 |
| VI | Núcleo Norte | - | - | 41,0 | 55,0 | 4,0 |
| VII | Núcleo Sur | - | - | 43,0 | 51,0 | 6,0 |
| VIII | Ctro E ER | - | - | - | - | - |
| IX | N LP-OBA | - | - | 48,0 | 43,0 | 9,0 |
| X | Ctro Bs As | - | - | 39,0 | 51,0 | 10,0 |
| XI | SO BA-S LP | - | - | - | - | - |
| XII | SE BA | 1,0 | 9,0 | 68,0 | 22,0 | - |
| XIII | San Luis | - | 16,0 | 67,0 | 17,0 | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - | - |
| Total Maíz Temprano | | 0,0 | 2,8 | 45,8 | 44,9 | 6,4 |
| Total al 10-01-18 | | 4,3 | 33,9 | 59,7 | 2,2 | - |

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Diferenciación de Hojas de Maíz Temprano: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|----------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | - | - | - | - |
| II | NEA | - | - | - | - |
| III | Ctro N Cba | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| IV | S Cba | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| V | Ctro N SFe | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| VI | Núcleo Norte | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| VII | Núcleo Sur | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| VIII | Ctro E ER | - | - | - | - |
| IX | N LP-OBA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| X | Ctro Bs As | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| XI | SO BA-S LP | - | - | - | - |
| XII | SE BA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| XIII | San Luis | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - |
| Total Maíz Temprano | | 69,1 | 69,7 | 75,8 | 73,5 |

Panojamiento de Maíz Temprano: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|----------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | - | - | - | - |
| II | NEA | - | - | - | - |
| III | Ctro N Cba | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 96,0 |
| IV | S Cba | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,8 |
| V | Ctro N SFe | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| VI | Núcleo Norte | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| VII | Núcleo Sur | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| VIII | Ctro E ER | - | - | - | - |
| IX | N LP-OBA | 89,0 | 85,0 | 98,0 | 94,8 |
| X | Ctro Bs As | 78,0 | 71,0 | 93,0 | 91,8 |
| XI | SO BA-S LP | - | - | - | - |
| XII | SE BA | 30,0 | 16,0 | 30,0 | 34,4 |
| XIII | San Luis | 79,0 | 70,0 | 80,0 | 86,8 |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - |
| Total Maíz Temprano | | 59,4 | 57,2 | 61,2 | 63,4 |

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Floración Femenina (R1) de Maíz Temprano: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|----------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | - | - | - | - |
| II | NEA | - | - | - | - |
| III | Ctro N Cba | 75,0 | 84,0 | 95,0 | 85,0 |
| IV | S Cba | 74,0 | 82,0 | 97,0 | 88,0 |
| V | Ctro N SFe | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| VI | Núcleo Norte | 85,0 | 98,0 | 100,0 | 95,4 |
| VII | Núcleo Sur | 88,0 | 93,0 | 98,0 | 95,2 |
| VIII | Ctro E ER | - | - | - | - |
| IX | N LP-OBA | 82,0 | 63,0 | 93,0 | 91,0 |
| X | Ctro Bs As | 50,0 | 49,0 | 70,0 | 67,0 |
| XI | SO BA-S LP | - | - | - | - |
| XII | SE BA | 8,0 | 6,0 | 15,0 | 13,8 |
| XIII | San Luis | 55,0 | 35,0 | 65,0 | 61,4 |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - |
| Total Maíz Temprano | | 48,8 | 50,1 | 57,4 | 56,7 |

Grano Pastoso de Maíz Temprano: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|----------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | - | - | - | - |
| II | NEA | - | - | - | - |
| III | Ctro N Cba | 1,0 | 5,0 | 18,0 | 8,0 |
| IV | S Cba | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 4,0 |
| V | Ctro N SFe | 38,0 | 59,0 | 58,0 | 60,5 |
| VI | Núcleo Norte | 12,0 | 14,0 | 26,0 | 29,4 |
| VII | Núcleo Sur | 12,0 | 9,0 | 15,0 | 13,3 |
| VIII | Ctro E ER | - | - | - | - |
| IX | N LP-OBA | 5,0 | - | 2,0 | 4,2 |
| X | Ctro Bs As | 1,0 | - | 1,0 | 0,6 |
| XI | SO BA-S LP | - | - | - | - |
| XII | SE BA | - | - | - | - |
| XIII | San Luis | - | 1,0 | 4,0 | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - |
| Total Maíz Temprano | | 6,2 | 6,7 | 10,5 | 10,0 |

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Maíz Temprano: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|----------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | - | - | - | - |
| II | NEA | - | - | - | - |
| III | Ctro N Cba | - | - | 1,0 | 0,2 |
| IV | S Cba | - | - | - | - |
| V | Ctro N SFe | 5,0 | 3,0 | 11,0 | 13,6 |
| VI | Núcleo Norte | - | - | - | - |
| VII | Núcleo Sur | - | - | - | - |
| VIII | Ctro E ER | - | - | - | - |
| IX | N LP-OBA | - | - | - | - |
| X | Ctro Bs As | - | - | - | - |
| XI | SO BA-S LP | - | - | - | - |
| XII | SE BA | - | - | - | - |
| XIII | San Luis | - | - | - | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - |
| Total Maíz Temprano | | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,5 |

Maíz Tardío

Siembra de Maíz Tardío: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | - | - | - | - |
| II | NEA | - | - | - | - |
| III | Ctro N Cba | 96,0 | 90,0 | 95,0 | 91,2 |
| IV | S Cba | 98,0 | 95,0 | 97,0 | 95,0 |
| V | Ctro N SFe | 75,0 | 35,0 | 40,0 | 68,6 |
| VI | Núcleo Norte | 100,0 | 90,0 | 96,0 | 97,8 |
| VII | Núcleo Sur | 95,0 | 90,0 | 92,0 | 97,7 |
| VIII | Ctro E ER | 93,0 | 38,0 | 60,0 | 89,6 |
| IX | N LP-OBA | 95,0 | 92,0 | 96,0 | 97,8 |
| X | Ctro Bs As | 96,0 | 95,0 | 98,0 | 99,2 |
| XI | SO BA-S LP | 100,0 | 90,0 | 95,0 | 99,6 |
| XII | SE BA | 100,0 | 88,0 | 92,0 | 99,0 |
| XIII | San Luis | 98,0 | 95,0 | 98,0 | 95,6 |
| XIV | Cuenca Sal | 97,0 | 90,0 | 95,0 | 99,4 |
| XV | Otras | - | - | - | - |
| Total Maíz Tardío | | 95,2 | 87,2 | 91,5 | 93,1 |

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición de Maíz Tardío: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Mala % | Regular % | Normal % | Buena % | Excelente % |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| I | NOA | - | - | - | - | - |
| II | NEA | - | - | - | - | - |
| III | Ctro N Cba | - | - | 63,0 | 35,0 | 2,0 |
| IV | S Cba | - | 3,0 | 44,0 | 46,0 | 7,0 |
| V | Ctro N SFe | - | - | - | - | - |
| VI | Núcleo Norte | - | 3,0 | 50,0 | 39,0 | 8,0 |
| VII | Núcleo Sur | - | 6,0 | 49,0 | 39,0 | 6,0 |
| VIII | Ctro E ER | - | - | - | - | - |
| IX | N LP-OBA | 1,0 | 6,0 | 47,0 | 41,0 | 5,0 |
| X | Ctro Bs As | 1,0 | 26,0 | 32,0 | 32,0 | 9,0 |
| XI | SO BA-S LP | - | - | - | - | - |
| XII | SE BA | 1,0 | 6,0 | 55,0 | 34,0 | 4,0 |
| XIII | San Luis | 1,0 | 15,0 | 48,0 | 29,0 | 7,0 |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - | - |
| Total Maíz Tardío | | 0,6 | 6,2 | 50,5 | 37,8 | 5,0 |
| Total al 10-01-18 | | 23,2 | 22,9 | 27,0 | 25,6 | 1,3 |

Condición Hídrica de Maíz Tardío: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Sequía % | Regular % | Adecuada % | Óptima % | Exceso % |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| I | NOA | - | - | - | - | - |
| II | NEA | - | - | - | - | - |
| III | Ctro N Cba | - | 28,0 | 57,0 | 11,0 | 4,0 |
| IV | S Cba | - | 22,0 | 63,0 | 15,0 | - |
| V | Ctro N SFe | - | - | 42,0 | 45,0 | 13,0 |
| VI | Núcleo Norte | - | - | 45,0 | 44,0 | 11,0 |
| VII | Núcleo Sur | - | - | 39,0 | 48,0 | 13,0 |
| VIII | Ctro E ER | - | - | - | - | - |
| IX | N LP-OBA | - | - | 48,0 | 38,0 | 14,0 |
| X | Ctro Bs As | - | - | 42,0 | 42,0 | 16,0 |
| XI | SO BA-S LP | - | - | - | - | - |
| XII | SE BA | 1,0 | 19,0 | 51,0 | 29,0 | - |
| XIII | San Luis | - | 22,0 | 61,0 | 17,0 | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - | - |
| Total Maíz Tardío | | 0,0 | 16,2 | 53,8 | 23,7 | 6,2 |
| Total al 10-01-18 | | 12,9 | 39,4 | 44,3 | 3,4 | - |

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Maíz Total

Siembra de Maíz Total: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | 30,0 | 42,0 | 55,0 | 35,4 |
| II | NEA | 36,0 | 33,0 | 38,0 | 42,3 |
| III | Ctro N Cba | 96,6 | 91,5 | 95,8 | 94,0 |
| IV | S Cba | 98,4 | 96,0 | 97,6 | 97,8 |
| V | Ctro N SFe | 83,8 | 57,8 | 61,0 | 82,5 |
| VI | Núcleo Norte | 100,0 | 98,7 | 99,5 | 99,5 |
| VII | Núcleo Sur | 99,0 | 98,5 | 98,8 | 99,5 |
| VIII | Ctro E ER | 97,2 | 75,2 | 84,0 | 96,2 |
| IX | N LP-OBA | 97,5 | 96,0 | 98,0 | 99,3 |
| X | Ctro Bs As | 97,6 | 97,3 | 98,9 | 99,5 |
| XI | SO BA-S LP | 100,0 | 95,0 | 97,5 | 99,9 |
| XII | SE BA | 100,0 | 94,0 | 96,0 | 99,9 |
| XIII | San Luis | 98,4 | 96,0 | 98,4 | 97,7 |
| XIV | Cuenca Sal | 98,2 | 94,5 | 97,3 | 99,6 |
| XV | Otras | 67,0 | 100,0 | 100,0 | 86,5 |
| Total Maíz | | 85,8 | 82,7 | 86,1 | 86,8 |

Condición de Maíz Total: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Mala % | Regular % | Normal % | Buena % | Excelente % |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| I | NOA | - | 3,0 | 45,0 | 44,0 | 8,0 |
| II | NEA | - | - | - | - | - |
| III | Ctro N Cba | - | 0,9 | 59,2 | 36,6 | 3,3 |
| IV | S Cba | 0,2 | 5,9 | 44,0 | 43,7 | 6,2 |
| V | Ctro N SFe | 0,4 | 5,3 | 36,2 | 48,4 | 9,6 |
| VI | Núcleo Norte | - | 2,1 | 29,0 | 53,0 | 15,9 |
| VII | Núcleo Sur | - | 0,8 | 25,8 | 56,2 | 17,2 |
| VIII | Ctro E ER | - | - | - | - | - |
| IX | N LP-OBA | 1,0 | 5,0 | 42,9 | 44,6 | 6,5 |
| X | Ctro Bs As | 1,0 | 17,8 | 37,9 | 34,7 | 8,5 |
| XI | SO BA-S LP | - | - | - | - | - |
| XII | SE BA | 0,5 | 5,0 | 50,8 | 39,7 | 4,0 |
| XIII | San Luis | 1,2 | 17,0 | 47,8 | 28,4 | 5,6 |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - | - |
| Total Maíz | | 0,4 | 5,5 | 43,0 | 43,0 | 8,1 |
| Total al 10-01-18 | | 11,4 | 28,2 | 31,2 | 26,4 | 2,9 |

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Maíz Total: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Sequía % | Regular % | Adecuada % | Óptima % | Exceso % |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| I | NOA | - | - | 41,0 | 53,0 | 6,0 |
| II | NEA | - | - | - | - | - |
| III | Ctro N Cba | - | 24,9 | 58,1 | 13,5 | 3,5 |
| IV | S Cba | - | 23,2 | 62,0 | 14,8 | - |
| V | Ctro N SFe | - | - | 35,7 | 51,9 | 12,4 |
| VI | Núcleo Norte | - | - | 41,5 | 53,6 | 4,9 |
| VII | Núcleo Sur | - | - | 42,4 | 50,6 | 7,0 |
| VIII | Ctro E ER | - | - | - | - | - |
| IX | N LP-OBA | - | - | 48,0 | 40,6 | 11,4 |
| X | Ctro Bs As | - | - | 40,6 | 46,1 | 13,3 |
| XI | SO BA-S LP | - | - | - | - | - |
| XII | SE BA | 1,0 | 13,8 | 59,9 | 25,4 | - |
| XIII | San Luis | - | 20,8 | 62,2 | 17,0 | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - | - |
| Total Maíz | | 0,0 | 9,2 | 49,7 | 34,8 | 6,3 |
| Total al 10-01-18 | | - | 41,5 | 52,4 | 6,1 | - |

Girasol

Condición de Girasol: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Mala % | Regular % | Normal % | Buena % | Excelente % |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| I | NOA | - | - | - | - | - |
| II | NEA | - | 18,0 | 46,0 | 31,0 | 5,0 |
| III | Ctro N Cba | - | - | - | - | - |
| IV | S Cba | - | - | - | - | - |
| V | Ctro N SFe | - | 11,0 | 47,0 | 38,0 | 4,0 |
| VI | Núcleo Norte | - | - | - | - | - |
| VII | Núcleo Sur | - | - | - | - | - |
| VIII | Ctro E ER | - | - | - | - | - |
| IX | N LP-OBA | 2,0 | 11,0 | 36,0 | 42,0 | 9,0 |
| X | Ctro Bs As | - | - | - | - | - |
| XI | SO BA-S LP | 3,0 | 5,0 | 36,0 | 42,0 | 14,0 |
| XII | SE BA | 3,0 | 4,0 | 31,0 | 52,0 | 10,0 |
| XIII | San Luis | - | - | - | - | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | 4,0 | 35,0 | 40,0 | 21,0 |
| XV | Otras | - | - | - | - | - |
| Total Girasol | | 2,0 | 7,9 | 37,3 | 42,6 | 10,2 |
| Total al 10-01-18 | | - | 21,8 | 28,3 | 33,4 | 16,5 |

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Girasol: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Sequía % | Regular % | Adecuada % | Óptima % | Exceso % |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| I | NOA | - | - | - | - | - |
| II | NEA | - | - | 35,0 | 43,0 | 22,0 |
| III | Ctro N Cba | - | - | - | - | - |
| IV | S Cba | - | - | - | - | - |
| V | Ctro N SFe | - | - | 34,0 | 45,0 | 21,0 |
| VI | Núcleo Norte | - | - | - | - | - |
| VII | Núcleo Sur | - | - | - | - | - |
| VIII | Ctro E ER | - | - | - | - | - |
| IX | N LP-OBA | - | - | 41,0 | 44,0 | 15,0 |
| X | Ctro Bs As | - | - | - | - | - |
| XI | SO BA-S LP | - | 4,0 | 44,0 | 47,0 | 5,0 |
| XII | SE BA | 2,0 | 15,0 | 71,0 | 12,0 | - |
| XIII | San Luis | - | - | - | - | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | 39,0 | 38,0 | 23,0 |
| XV | Otras | - | - | - | - | - |
| Total Girasol | | 0,6 | 5,6 | 47,4 | 35,9 | 10,5 |
| Total al 10-01-18 | | 12,6 | 31,5 | 49,9 | 6,0 | - |

Botón Floral de Girasol: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | - | - | - | - |
| II | NEA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| III | Ctro N Cba | - | - | - | - |
| IV | S Cba | - | - | - | - |
| V | Ctro N SFe | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| VI | Núcleo Norte | - | - | - | - |
| VII | Núcleo Sur | - | - | - | - |
| VIII | Ctro E ER | - | - | - | - |
| IX | N LP-OBA | 92,0 | 71,0 | 86,0 | 96,0 |
| X | Ctro Bs As | - | - | - | - |
| XI | SO BA-S LP | 65,0 | 31,0 | 50,0 | 66,2 |
| XII | SE BA | 70,0 | 33,0 | 51,0 | 65,2 |
| XIII | San Luis | - | - | - | - |
| XIV | Cuenca Sal | 87,0 | 72,0 | 83,0 | 89,0 |
| XV | Otras | - | - | - | - |
| Total Girasol | | 83,2 | 66,4 | 76,2 | 81,6 |

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Floración de Girasol: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | - | - | - | - |
| II | NEA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| III | Ctro N Cba | - | - | - | - |
| IV | S Cba | - | - | - | - |
| V | Ctro N SFe | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| VI | Núcleo Norte | - | - | - | - |
| VII | Núcleo Sur | - | - | - | - |
| VIII | Ctro E ER | - | - | - | - |
| IX | N LP-OBA | 52,0 | 29,0 | 46,0 | 51,0 |
| X | Ctro Bs As | - | - | - | - |
| XI | SO BA-S LP | 40,0 | - | 16,0 | 28,0 |
| XII | SE BA | 48,0 | 4,0 | 22,0 | 35,2 |
| XIII | San Luis | - | - | - | - |
| XIV | Cuenca Sal | 38,0 | 48,0 | 62,0 | 36,6 |
| XV | Otras | - | - | - | - |
| Total Girasol | | 65,8 | 47,8 | 57,9 | 55,9 |

Llenado de Grano de Girasol: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | - | - | - | - |
| II | NEA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| III | Ctro N Cba | - | - | - | - |
| IV | S Cba | - | - | - | - |
| V | Ctro N SFe | 88,0 | 100,0 | 100,0 | 97,6 |
| VI | Núcleo Norte | - | - | - | - |
| VII | Núcleo Sur | - | - | - | - |
| VIII | Ctro E ER | - | - | - | - |
| IX | N LP-OBA | 17,0 | 2,0 | 15,0 | 12,0 |
| X | Ctro Bs As | - | - | - | - |
| XI | SO BA-S LP | 3,0 | - | - | 2,4 |
| XII | SE BA | 10,0 | - | - | 2,6 |
| XIII | San Luis | - | - | - | - |
| XIV | Cuenca Sal | 14,0 | - | 13,0 | 12,2 |
| XV | Otras | - | - | - | - |
| Total Girasol | | 41,1 | 39,2 | 41,9 | 34,1 |

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Girasol: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | - | - | - | - |
| II | NEA | 95,0 | 92,0 | 100,0 | 99,0 |
| III | Ctro N Cba | - | - | - | - |
| IV | S Cba | - | - | - | - |
| V | Ctro N SFe | 72,0 | 63,0 | 76,0 | 73,0 |
| VI | Núcleo Norte | - | - | - | - |
| VII | Núcleo Sur | - | - | - | - |
| VIII | Ctro E ER | - | - | - | - |
| IX | N LP-OBA | - | - | - | - |
| X | Ctro Bs As | - | - | - | - |
| XI | SO BA-S LP | - | - | - | - |
| XII | SE BA | - | - | - | - |
| XIII | San Luis | - | - | - | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - |
| Total Girasol | | 31,7 | 30,7 | 34,7 | 27,0 |

Cosecha de Girasol: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | - | - | - | - |
| II | NEA | 70,0 | 52,0 | 63,0 | 57,8 |
| III | Ctro N Cba | 10,0 | - | 8,0 | 6,0 |
| IV | S Cba | - | - | - | - |
| V | Ctro N SFe | 32,0 | 18,0 | 30,0 | 17,3 |
| VI | Núcleo Norte | 4,0 | - | 5,0 | 1,8 |
| VII | Núcleo Sur | - | - | - | - |
| VIII | Ctro E ER | - | - | - | - |
| IX | N LP-OBA | - | - | - | - |
| X | Ctro Bs As | - | - | - | - |
| XI | SO BA-S LP | - | - | - | - |
| XII | SE BA | - | - | - | - |
| XIII | San Luis | - | - | - | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - |
| Total Girasol | | 19,6 | 14,5 | 18,8 | 12,5 |

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Trigo

Condición de Trigo: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Mala % | Regular % | Normal % | Buena % | Excelente % |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| I | NOA | - | - | - | - | - |
| II | NEA | - | - | - | - | - |
| III | Ctro N Cba | - | - | - | - | - |
| IV | S Cba | - | - | - | - | - |
| V | Ctro N SFe | - | - | - | - | - |
| VI | Núcleo Norte | - | - | - | - | - |
| VII | Núcleo Sur | - | - | - | - | - |
| VIII | Ctro E ER | - | - | - | - | - |
| IX | N LP-OBA | - | - | - | - | - |
| X | Ctro Bs As | 4,0 | 20,0 | 38,0 | 32,0 | 6,0 |
| XI | SO BA-S LP | 5,0 | 15,0 | 35,0 | 37,0 | 8,0 |
| XII | SE BA | 4,0 | 6,0 | 31,0 | 45,0 | 14,0 |
| XIII | San Luis | - | - | - | - | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - | - |
| Total Trigo | | 4,3 | 9,5 | 32,6 | 41,8 | 11,7 |
| Total al 10-01-18 | | - | 13,7 | 32,7 | 53,6 | - |

Condición Hídrica de Trigo: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Sequía % | Regular % | Adecuada % | Óptima % | Exceso % |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| I | NOA | - | - | - | - | - |
| II | NEA | - | - | - | - | - |
| III | Ctro N Cba | - | - | - | - | - |
| IV | S Cba | - | - | - | - | - |
| V | Ctro N SFe | - | - | - | - | - |
| VI | Núcleo Norte | - | - | - | - | - |
| VII | Núcleo Sur | - | - | - | - | - |
| VIII | Ctro E ER | - | - | - | - | - |
| IX | N LP-OBA | - | - | - | - | - |
| X | Ctro Bs As | - | - | 21,0 | 68,0 | 11,0 |
| XI | SO BA-S LP | - | 6,0 | 65,0 | 27,0 | 2,0 |
| XII | SE BA | - | 15,0 | 67,0 | 18,0 | - |
| XIII | San Luis | - | - | - | - | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - | - |
| Total Trigo | | - | 11,5 | 63,9 | 23,3 | 1,2 |
| Total al 10-01-18 | | 11,3 | 60,0 | 28,7 | - | - |

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Trigo: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| II | NEA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| III | Ctro N Cba | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| IV | S Cba | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| V | Ctro N SFe | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| VI | Núcleo Norte | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| VII | Núcleo Sur | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| VIII | Ctro E ER | - | - | - | - |
| IX | N LP-OBA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| X | Ctro Bs As | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,6 |
| XI | SO BA-S LP | 100,0 | 84,0 | 100,0 | 100,0 |
| XII | SE BA | 100,0 | 83,0 | 100,0 | 99,8 |
| XIII | San Luis | - | - | - | - |
| XIV | Cuenca Sal | - | - | - | - |
| XV | Otras | - | - | - | - |
| Total Trigo | | 100,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 |

Cosecha de Trigo: datos al 09 de Enero, 2019

| Zonas-PAS | | Enero 10, 2018 % | Enero 02, 2019 % | Enero 09, 2019 % | Promedio 2013/2018 % |
|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| I | NOA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| II | NEA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| III | Ctro N Cba | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| IV | S Cba | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| V | Ctro N SFe | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| VI | Núcleo Norte | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| VII | Núcleo Sur | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| VIII | Ctro E ER | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| IX | N LP-OBA | 100,0 | 85,0 | 100,0 | 99,0 |
| X | Ctro Bs As | 100,0 | 78,0 | 96,0 | 95,8 |
| XI | SO BA-S LP | 95,0 | 70,0 | 85,0 | 91,4 |
| XII | SE BA | 90,0 | 55,0 | 70,0 | 77,8 |
| XIII | San Luis | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| XIV | Cuenca Sal | 100,0 | 90,0 | 98,0 | 95,8 |
| XV | Otras | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Total Trigo | | 98,5 | 90,6 | 95,6 | 96,0 |